

Der afrikanische Wildhund

geschrieben von
Tim Meier

Verlag: MyBooks



Inhaltsverzeichnis:

1. Identifizierung
2. Im Rudel
3. Bedrohung
4. Aussehen
5. Lebensraum
6. Die Jagd



www.wikipedia.com

Der afrikanische Wildhund wird auch „Lycan pictus“ genannt. Lycan pictus heisst übersetzt bemahter Wolf /bunter Wolf. Er gehört zur Ordnung „Raubtiere“ (Carnivora). Zu der Familie Hunde (Canidae). Die Überfamilie die Hundartige (Canoidea). Der afrikanische Wildhund ist der grösste Wildhund der afrikanischen Savanne. Heute gibt es nur noch ca. 5500 freilebende Wildhunde.

Identifizierung:

Ausnahmefällen kommen bis zu 17 Junge auf die Welt. Nur die Mutter säugt die Jungen. Das Babysitten wird im Rudel verteilt. Die Jungen Rüden füttern die Jungen auch. Kranke und verletzte Tiere werden wie die Jungen vom Verband gepflegt.

das Alpha-Paar erzeugt Junge. Niedere Rudeltiere werden am verpaaren gehindert. Die Tragzeit beträgt ca. 70 Tage. Es kommen ca. sechs bis acht Junge pro Wurf. In

Bedrohung:

Der Wildhund kommt – in Freiheit - nur auf dem afrikanischen Kontinent vor.

Gemäss IUCN gehört der Wildhund zu den stark gefährdeten Tieren.

Der Wildhund ist stark bedroht durch Lebensraumverlust und Krankheiten wie Tollwut und
www.minibooks.ch

Im Rudel:

Der afrikanische Wildhund ist ein Rudeltier. Der Wildhund ist ein soziales Rudeltier. Die Wildhunde haben keine festen Reviere. Im durchschnitt leben ca. 10 Tiere pro Rudel. Früher gab es vielleicht Rudel mit ca. 40-100 Tieren .Nur

-6-

-5-

-7-

-4-

-3-

-2-