

<b>Indikation:</b> - Reisekrankheit, Schwangerschaftserbrechen	<b>Nebenwirkung:</b> - Müdigkeitserscheinung, Mundtrockenheit, Tachykardie, Magenbeschwerden, selten; Urtikaria (Nesselausschlag)	<b>Applikationsart:</b> - oral  <b>Abgabekategorie: -D</b>	Domperidon-Mepha® oro / Motilium  <b>Wirkstoff:</b> - Domperidon
<b>Wirkung:</b> - Nausea, Erbrechen, Reisekrankheit	<b>Applikationsform:</b> - Fest / Kapsel		<b>Dosis:</b> - 3 Schmelztabletten zu 10mg pro Tag /
<b>Kontraindikation:</b> - Überempfindlichkeit gegenüber dem Inhaltsstoff, Prostatahypertrophie, Grüner Star	<b>Applikationsort:</b> - Schleimhaut des Magen- Darm-Trakts		
-6-	-7-	www.minibooks.ch	
-5-	-4-	-3-	-2-
	<b>Abgabekategorie: - B</b>	- Krämpfe, Schwindelgefühl, Herzrhythmusstörungen, Unkontrollierte Bewegung	- Übelkeit, Erbrechen
<b>Applikationsort:</b> - Schleimhaut des Magen- Darm-Trakts	<b>Nebenwirkung:</b>	- allergisch gegenüber dem Wirkstoff, Lebererkrankungen, Probleme mit Kalium- oder Magnesiumspiegel, Herzinsuffizienz	<b>Indikation:</b> - 1mg Filmtablette enthält= 10mg Domperidon - 1ml Suspension enthält 1mg Domperidon - 1 lingual Schmerztablette enthält 10mg Domperidon Empfohlen wird es dies in oralen Formen 15-30min vor dem Essen einzunehmen.
<b>Applikationsart:</b> - Fest / Tabletten	<b>Applikationsform:</b>	<b>Kontraindikation:</b> - Gegen Übelkeit, Erbrechen	
<b>Wirkstoff:</b> - Meclozin dihydrochlorid, Coffein, Pyridoxin hydrochlorid	<b>Applikationsform:</b> des Gesichts oder der Arme und Beine, Zittern		
<b>Dosis:</b> - 1-4 Kapseln in 24 Stunden	<b>Applikationsort:</b>		
Itinerol B6			